



Os comentários devem ser consultados.

Para recomendações de vacinação para gestantes, consulte os *Calendário de vacinação SBIm gestante*.

VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: [sbim.org.br/covid-19](http://sbim.org.br/covid-19)

Para definir vacinas e esquemas de doses na adolescência, considerar o passado vacinal.

| Vacinas  | Esquemas e recomendações  | Comentários  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS   |                                |
|--|---|--|--|--------------------------------|
|  |   |  | Gratuitas nas UBS*   | Clínicas privadas de vacinação |
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duas doses acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas.</li> <li>• Para adolescentes com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraindicada para gestantes. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>).</li> <li>• Até 12 anos de idade, considerar a aplicação de vacina combinada quádrupla viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela / SCRv).</li> </ul>   | SIM, SCR   | SIM, SCR e SCRv                |
| Hepatites A, B ou A e B  | <b>Hepatite A:</b> duas doses, no esquema 0 - 6 meses.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adolescentes não vacinados na infância para as hepatites A e B devem ser vacinados o mais precocemente possível.</li> <li>• A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>  | NÃO  | SIM                            |
|  | <b>Hepatite B:</b> três doses, esquema 0 - 1 - 6 meses.   |  | SIM  | SIM                            |
|  | <b>Hepatite A e B:</b> para menores de 16 anos: duas doses aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos: três doses aos 0 - 1 - 6 meses.  |  | NÃO  | SIM                            |
| HPV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o esquema de vacinação não foi iniciado aos 9 anos, aplicar a vacina o mais precocemente possível.</li> <li>• O esquema de vacinação para meninas e meninos menores de 15 anos é de duas doses com intervalo de seis meses (0 - 6 meses).</li> <li>• Para adolescentes com idade ≥ 15 anos, não imunizados anteriormente, o esquema é de três doses (0 - 1 a 2 - 6 meses).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adolescentes mesmo que previamente expostos podem ser vacinados.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>   | SIM – duas doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos       | SIM                            |
| Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP | <p><b>Com esquema de vacinação completo, incluindo a dose dos 9-10 anos:</b> dose de reforço, preferencialmente com dTpa, dez anos após a última.</p> <p><b>Com esquema de vacinação incompleto:</b> uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT.</li> <li>• O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, para adolescentes, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da <i>Bordetella pertussis</i>, principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes.</li> <li>• Considerar antecipar reforço com dTpa para cinco anos após a última dose de vacina contendo o componente <i>pertussis</i> para adolescentes contactantes de lactentes.</li> <li>• Para adolescentes que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).</li> <li>• A dTpa-VIP pode substituir a dTpa, inclusive em gestantes, ficando a critério médico o uso <i>off label</i> nesses casos.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> <li>• A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.</li> </ul> | SIM, dT para todos. dTpa para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto | SIM, dTpa e dTpa-VIP           |
| Dupla adulto (difteria e tétano) – dT  | <b>Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:</b> uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses.   |  |  |                                |
| Varicela (catapora)  | <b>Para suscetíveis:</b> duas doses. <b>Para menores de 13 anos:</b> intervalo de três meses. <b>A partir de 13 anos:</b> intervalo de um a dois meses.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>).</li> <li>• Até 12 anos de idade, considerar a aplicação de vacina combinada quádrupla viral (SCRv).</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>   | NÃO  | SIM, varicela e SCRv           |
| Influenza (gripe)  | Dose única anual.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por conferir maior cobertura das cepas circulantes.</li> <li>• Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>   | SIM, 3V para grupos de risco   | SIM, 3V e 4V                   |
| Meningocócicas conjugadas ACWY/C   | <b>Para não vacinados:</b> duas doses com intervalo de cinco anos. <b>Para vacinados na infância:</b> reforço aos 11 anos ou cinco anos após a última dose.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>   | SIM, menACWY (11 e 12 anos)  | SIM                            |
| Meningocócica B  | Dois doses com intervalo de um a dois meses. Não se conhece a duração da proteção conferida e, conseqüentemente, a necessidade de dose(s) de reforço como rotina.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em grupos de alto risco: portadores de asplenia anatômica ou funcional, deficiência de complemento ou pessoas em uso de biológicos que interferem na via do complemento é recomendada uma dose de reforço um ano após o fim do esquema de doses básico para cada faixa etária e revacinar a cada três anos.</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>  | NÃO  | SIM                            |
| Febre amarela  | Dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada, em especial para aqueles vacinados antes dos 2 anos de idade, pela maior possibilidade de falha vacinal primária.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É contraindicada em nutrízes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias.</li> <li>• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os <i>Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais</i>).</li> <li>• Para gestantes: consulte o <i>Calendário de vacinação SBIm gestante</i>.</li> </ul>  | SIM  | SIM                            |
| Dengue   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendada apenas para adolescentes soropositivos.</li> <li>• Esquema de três doses com intervalo de seis meses (0 - 6 - 12 meses).</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciada para pessoas entre 9 e 45 anos.</li> <li>• Contraindicada para adolescentes soronegativos, imunodeprimidos, gestantes e nutrízes.</li> </ul>   | NÃO  | SIM                            |